

FERTILIZANTE FOLIAR

AELIPTION

Líquido soluble

Composición:

Nitrógeno (N)	5,20 %
Fósforo asimilable (P) – proveniente de Acido Fosforoso.....	9,80 %
Potasio soluble (K).....	2,20 %
Azufre de sulfatos (S).....	2,50 %
Cobre (Cu).....	3,00 %
Zinc (Zn).....	0,05 %
Boro (B).....	0,02 %
Manganeso (Mn).....	0,05 %
Hierro (Fe).....	0,10 %
Magnesio (Mg).....	0,60 %

Inscrito en SENASA con el N° **17.076**

Grado: 5-10-2,2

Grado equivalente: 5-23-2,6

Tensión sup.: 42,6 dyn/cm

pH: 2,3

Densidad: 1,33 g/mL

AELIPTION es un fertilizante que aporta macro y micro-elementos para la nutrición vegetal.

El producto es diluido en agua, por lo que no es necesario preparar una solución madre.

Evitar contaminar fuentes o cursos de agua. Destruya los envases vacíos, perforándolos y remitiéndolos a empresas habilitadas para la disposición final de envases y residuos.

En caso de derrame, cubrir con material absorbente y destinar a disposición final en empresas habilitadas.

Cultivos a tratar: Trigo y Cereales de Invierno, Soja, Maíz, Sorgo, Girasol, Lenteja, Arveja, Garbanzo, Alfalfa, Cítricos.

Caudal a aplicar: De 50 a 80 lts / ha en aplicaciones terrestres y entre 10 y 20 lts /ha en aplicaciones aéreas.

Calidad de la aplicación: Se recomienda aplicar entre 20 y 40 gotas/ cm². Evitar períodos de mayor insolación y temperaturas mayores a 28 /30 ° C.

Preparación del caldo a asperjar:

Corregir el pH para que se ubique entre 5.5 y 6.5.

Agregar agua al tanque del equipo aplicador, hasta el 50% de su capacidad.

Con el agitador en funcionamiento adicionar en este orden:

Primero: LECITHIN SILICON MAX - Segundo: AELIPTION. Luego completar el volumen final, siempre con agitación permanente.

AELIPTION puede mezclarse con herbicidas, insecticidas y funguicidas.

Recomendaciones de Uso:

Cuando se pierde la posibilidad de la aplicación temprana o se prevé que puede haber inconvenientes para realizar aplicaciones posteriores, se aconseja hacer una **Aplicación Unica** con la dosis completa. Acondicionar siempre el caldo a asperjar con regulador de pH para que el mismo se ubique entre 5.5 y 6.5. y con el penetrante foliar, **LECITHIN SILICON MAX.**

En aplicaciones divididas no debe variarse la dosis mínima de **LECITHIN SILICON MAX.**

No aplicar en horas de calor o máxima insolación.

AELIPTION es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común incorporados al suelo.

Dosis:

Las dosis son orientativas y pueden ser modificadas según las necesidades del cultivo y bajo asesoramiento de un profesional Ingeniero Agrónomo.

Aplicar **AELIPTION**, con cualquier tipo de máquina, mochila o aspersión, a las dosis indicadas en el siguiente cuadro.

APLICACIÓN UNICA		
CULTIVO	DOSIS/HA	MOMENTO OPORTUNO
TRIGO Y CEREALES INV	200 cc	CON EL CULTIVO EN ESTADO DE HOJA BANDERA
MAIZ		CON EL CULTIVO CON 8 HOJAS DESARROLLADAS
SOJA		CON EL CULTIVO ENTRE LOS ESTADOS DE R2 A R3
GIRASOL		ANTES DEL INICIO DE BOTON FLORAL
ARVEJA Y LENTEJA		CON EL CULTIVO CON 10 a 12 HOJAS DESARROLLADAS
GARBANZO	300 cc	CON EL CULTIVO CON 50% EN ANTESIS FLORAL
APLICACIÓN DIVIDIDA		
CULTIVO	DOSIS / HA	MOMENTO OPORTUNO
TRIGO Y CEREALES INV	100 cc	EN PRE MACOLLAJE Y REPETIR EN HOJA BANDERA
MAIZ	en cada	CON 4/5 HOJAS Y REPETIR CON CULTIVO EN 50% ANTESIS FLORAL
SOJA	una de las	CON EL CULTIVO CON 10 cm DE ALTURA Y REPETIR EN R3 R4
GIRASOL	aplicaciones	CON 4 A 6 HOJAS Y REPETIR EN BOTON FLORAL
ARVEJA Y	50 cc	1er APLIC: CON CULTIVO CON 4 a 6 HOJAS DESARROLLADAS
LENTEJA	150 cc	2da APLIC: CON EL CULTIVO EN 50% EN ANTESIS FLORAL
GARBANZO	100 cc	1er APLIC: CON 15/20 cm DE ALTURA
	200 cc	2da APLIC: CON EL CULTIVO EN 50% EN ANTESIS FLORAL
ALFALFA	150 cc	1er APLIC: 10 DIAS ANTES DE MARCAR BOTON FLORAL
	100 cc	A PARTIR DEL 4to ó 5to DIA LUEGO DE CADA CORTE O PASTOREO
CITRICOS: LIMON	500 cc	EN FLORACION CON 50% DE BOTONES FLORALES ABIERTOS
	en cada	EN FASE FINAL DE FLORACION: CON 3/4 DE CAIDA DE PETALOS
	una de las	FRUTOS ENTRE 21 y 36 mm DE DIAMETRO EXTERNO
	aplicaciones	FRUTOS ENTRE 36 y 60 mm DE DIAMETRO EXTERNO

PRECAUCIONES

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
 NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
 INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS
 EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A Posadas (Haedo) Tel (011) 4654-6648, 4658- 7777 (internos 1102 y 1103)
 Centro Toxicológico del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Bs. As.) Tel (011) 4962-6666 y 4962-2247.
 Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas Tel (011) 5950-8804/06 int. 480
 TAS – Centro Toxicológico de Rosario Tel. (0341)448-0077 y 424-2727
 Hospital Municipal de Infantes de Córdoba Tel (0351) 470-3492 y 470-3952.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

Contenido neto:

Industria Argentina

FRAGARIA S.A