

FUNGICIDA
TERAPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

GRUPO 1

GRUPO M3

BETTER CURASEMILLAS

Suspensión Concentrada para Tratamiento de Semillas
Listo para Usar

Composición:

carbendazim: (2-metoxicarbamoil)-benzimidazol.....	15 g.
tiram: bisulfuro de tetrametil tiocarbamilo.....	35 g.
coadyuvantes y agua c.s.p.....	100 cm ³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en el SENASA con el N° **34.556**

Lote N°

Contenido neto: **5 L**

Fecha de vencimiento:

Industria Argentina

No Inflamable

FRAGARIA S.A.

Calle 57 N° 93 bis - 2607 – Villa Cañas
Pcia. de Santa Fe – Rep. Argentina
Tel./Fax 03462 450100 L. Rot. info@fragaria.com.ar
www.fragaria.com.ar

FRAGARIA S.A. no se responsabiliza de los daños que se puedan producir por un uso diferente al indicado en el rótulo del producto

CUIDADO



PRECAUCIONES

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACIONES LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel, los ojos y la contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios empleados en la aplicación del producto. No comer, beber o fumar durante las tareas. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores, sin previo lavado.

RIESGOS AMBIENTALES: **Prácticamente no tóxico para aves.**

Muy tóxico para peces: evitar que el producto o la semilla tratada entre en contacto con agua libre o cursos de agua. Evitar que el producto o el líquido de enjuague de los envases, llegue a contaminar cursos o fuentes de agua.

Moderadamente tóxico para abejas: por su forma de uso no se espera exposición a las mismas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: El remanente de producto puede utilizarse para el curado de semilla. De lo contrario, deposítelo en un recipiente adecuado y proceda a eliminarlo mediante un servicio especializado.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Efectuar un triple lavado antes de proceder a la destrucción de los envases. Perfore el envase vacío para inutilizarlo completamente. Recurra a un servicio especializado en residuos de plaguicidas y envases vacíos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original cerrado en edificios bien ventilados, frescos, secos y alejados de fuentes de calor.

DERRAMES: Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final. Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

PRIMEROS AUXILIOS: Si hubo contaminación, quitarse la ropa y lavar bien la piel con agua y jabón. Si se contaminan los ojos, lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. En caso de ingestión, inducir al vómito con agua tibia salada o solución de mostaza. Dar papilla de carbón activado para absorber el tóxico remanente. Mantener al paciente en reposo. En todos los casos procurar asistencia médica. En caso de accidente por inhalación: llevar a un lugar bien ventilado manteniendo al individuo quieto y ventilado.

Advertencia para el médico: Producto ligeramente peligro (Clase III)

Toxicidad inhalatoria: Moderadamente tóxico Categoría III (Cuidado)

Irritación dermal: No irritante dermal

Irritación ocular: No irritante ocular

Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación.

Grupo químico: Benzimidazol y Dimetilditiocarbamato

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Por ingestión, pueden manifestarse síntomas de envenenamiento agudo, como náuseas y vómitos, cefaleas. Afecta al sistema nervioso central. Puede causar irritación ocular.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247

- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777
- Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas. Tel. (011) 5950-8804/6 int. 480
- T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas. Rosario. Tel. (0341) 448-0077 y 424-2727
- Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 423-3303 y 422-9961

GENERALIDADES: **BETTER CURASEMILLAS** es un fungicida sistémico y de contacto para el tratamiento de semillas destinadas a la siembra. Protege a la semilla del ataque de hongos patógenos, por dentro y por fuera, aumentando el porcentaje de germinación y consecuentemente, el rendimiento del cultivo.

La acción de cobertura del tiram, sumado a la acción de traslación del carbendazim, permite un control integral de la semilla hasta la plántula.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: Agitar bien antes de usar. Aplique directamente sobre la semilla.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: En tambor giratorio o máquinas curadoras: complete no más de 2/3 partes de la capacidad del tambor con semillas, agregue luego la dosis de **BETTER CURASEMILLAS**, hacer girar lentamente durante algunos minutos hasta que quede uniformemente coloreada. Proceda a sembrar.

Cuando se inocula semillas de leguminosas, se debe aplicar primero **BETTER CURASEMILLAS** mezclando para obtener una distribución uniforme sobre la semilla.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedades	Dosis
SOJA	Damping off y complejos de hongos del suelo y/o podredumbre de la semilla (Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Phytium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp.) y patógenos presentes en semillas: Mancha púrpura (Cercospora kikuchi), Tizón del tallo y de la vaina (Phomopsis sojae), Cancro del tallo (Phomopsis phaseolis var. meridionalis): del cual no previene de un ataque posterior del hongo a campo. Podredumbre de la semilla (Mucor sp., Phytophthora sp., Rhizopus sp.) Antracnosis (Colletotrichum sp.)	200 cc / 100 kgs. de semilla
MANÍ (sin cáscara)	Damping off (mal de los almácigos), (Fusarium sp., Rhizoctonia sp., Phytium sp., Aspergillus flavus, A. níger, Penicillium sp.) y patógenos presentes en semillas.	330 cc / 100 kgs. de semilla
ALGODÓN	Damping off (mal de los almácigos), (Fusarium sp., Rhizoctonia sp., Phytium sp., Aspergillus sp.) y patógenos presentes en semillas.	200 cc / 100 kgs. de semilla
MAÍZ MAIZ DULCE	Podredumbre seca de la espiga (Fusarium moniliforme, Diplodia zeae). Damping off (Rhizoctonia sp., Penicillium sp., Aspergillus sp.)	200 cc / 100 kgs. de semilla
TRIGO CEBADA AVENA CEBADILLA	Damping off (Fusarium sp., Rhizoctonia sp., Phytium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp.) y patógenos del suelo en las semillas. Carbón volador (Ustilago tritici), Caries (Tilletia	200 cc / 100 kgs. de semilla

	spp.), Fusariosis o Golpe blanco (Fusarium graminearum.)	
--	---	--

RESTRICCIONES DE USO: Las semillas tratadas serán destinadas únicamente a la siembra, no siendo aptas para alimentación, forraje o extracción de aceite.

La venta de semilla tratada, para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley 18.073 que prohíbe la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados a consumo humano y/o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas) en granos para consumo, la ley establece severas penas a los infractores. Recuerde que una bolsa de semilla curada, mezclada en varios silos de granos para consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa.

Período de carencia: no aplicable por su forma de uso (terápico de semillas).

Tiempo de reingreso al área tratada: no aplicable por su forma de uso (terápico de semillas).

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con otros terapicos para tratamiento de semillas, excepto aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico en las dosis de uso recomendadas en esta etiqueta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.