

FUNGICIDA
TERÁPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

GRUPO 1

GRUPO M3

Curasemillas MIRKA

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas
Listo para usar

Composición:

carbendazim: (2-metoxycarbamoil)-benzimidazol.....	10 g
tiram: bisulfuro de tetrametil tiocarbamilo.....	10 g
coadyuvantes y agua c.s.p.....	100 cm ³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en el SENASA con el N° **34.035**

Origen: Argentina

Fecha de vencimiento:

Contenido neto: **5 L**

Lote N°:

No Inflamable

FRAGARIA S.A.

Calle 57 N° 93 bis (2607) – Villa Cañas
Pcia. de Santa Fe – Rep. Argentina
Tel./ Fax (03462) 450-100 info@fragaria.com.ar
www.fragaria.com.ar

Nota: FRAGARIA S.A. no se responsabiliza de los daños que se puedan producir por un uso diferente al indicado en el rótulo del producto.

CUIDADO



PRECAUCIONES

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACIONES LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con los ojos, la piel y la contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavar con agua y jabón neutro todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios empleados en la aplicación del producto. No comer, beber o fumar durante las tareas. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores, sin previo lavado.

RIESGOS AMBIENTALES: Ligeramente tóxico para aves.

Moderadamente tóxico para peces: No contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.

Virtualmente no tóxico para abejas: Por su forma de uso no se espera exposición a las mismas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: El remanente de producto puede utilizarse para el curado de semilla. De lo contrario, deposítelo en un recipiente adecuado y proceda a eliminarlo mediante un servicio especializado.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Efectuar un triple lavado con agua antes de proceder a la destrucción de los envases. Perfore el envase vacío para inutilizarlo completamente. Recorra a empresas habilitadas en residuos de plaguicidas y envases vacíos. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original cerrado en edificios bien ventilados, frescos, secos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. No almacenar en lugares habitados por personas o animales.

DERRAMES: En caso de derrames, inactivar con soda cáustica. Absorber el líquido derramado con un material inerte no combustible: arena, tierra, arcilla, etc. y colocar en recipientes para su disposición final. Recorra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos. Asegúrese que durante la operación de limpieza el lugar esté ventilado y hacerlo con viento a favor.

PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos, procurar asistencia médica y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:

En caso de ingestión: Procurar asistencia médica de inmediato. Mostrar el envase con su etiqueta. No administrar nada por boca a una persona inconsciente. Mantener al paciente acostado de lado.

Contacto con la piel: Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua). Lavar la ropa contaminada antes de usar nuevamente.

Contacto ocular: Inmediatamente lavar los ojos con agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio. Si no hay respiración, practicar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno.

Advertencia para el médico: Producto ligeramente peligroso (Clase III)
Toxicidad inhalatoria: Moderadamente tóxico Categoría III – CUIDADO.
Irritación dermal: Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV
Irritación ocular: Leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV.
Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación.
Grupo químico: Benzimidazol y Dimetilditiocarbamato

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Por ingestión, pueden manifestarse síntomas de envenenamiento agudo, como náuseas y vómitos, cefaleas. Afecta al sistema nervioso central.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
- Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777
- Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 423-3303 y 422-9961
- T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas. Rosario. Tel. (0341) 448-0077 y 424-2727

GENERALIDADES: CURASEMILLAS MIRKA es un fungicida sistémico y de contacto para el tratamiento de semillas destinadas a la siembra. Protege a la semilla del ataque de hongos patógenos, por dentro y por fuera, aumentando el porcentaje de germinación y consecuentemente, el rendimiento del cultivo. La acción de cobertura del tiram, sumado a la acción de traslación del carbendazim, permite un control integral de la semilla hasta la plántula.

CURASEMILLAS MIRKA es una formulación líquida acuosa para la aplicación directa sobre la semilla, sin necesidad de utilizar otro vehículo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación: Agitar bien antes de usar.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: En tambor giratorio o máquina curadora: complete no más de 2/3 partes de la capacidad del tambor o curador con semillas, agregue luego la dosis de **CURASEMILLAS MIRKA**, mientras hace girar el tambor lentamente durante algunos minutos hasta que quede uniformemente coloreada. Proceda a sembrar.

Cuando se inocula semillas de leguminosas, se debe aplicar primero **CURASEMILLAS MIRKA** mezclando para obtener una distribución uniforme sobre la semilla. No debe humedecer la semilla con otro líquido.

RECOMENDACIONES DE USO

Tipo de semilla	Enfermedades que controla	Dosis cada 100 kg de semilla
Trigo, cebada, avena y cebadilla	Carbón volador (<i>Ustilago tritici</i>), Caries (<i>Tilletia</i> spp.), Fusariosis o Golpe blanco (<i>Fusarium</i> spp.)	300 cm ³
Soja	Cancro del tallo (<i>Phomopsis phaseolis</i> var. <i>meridionalis</i>)	600 cm ³ Controla el patógeno que está en la semilla, no previene el ataque posterior a campo
Soja, trigo, poroto, maní descascarado, lenteja	Damping off y complejo de hongos del suelo (<i>Fusarium</i> sp.; <i>Rhizoctonia</i> sp.; <i>Phytophthora</i> sp.; <i>Mucor</i> sp.; <i>Diplodia</i> sp.; <i>Aspergillus</i> sp.; <i>Penicillium</i> sp.; <i>Ascochita</i> sp.; <i>Micosphaerella</i> sp.)	300 cm ³
Arveja		625 cm ³
Alfalfa		1000 cm ³

Papa semilla: control de punta seca o marchitez (*Fusarium* spp) y costra negra (*Rhizoctonia* spp.)

Dosis y forma de aplicación: preparar una suspensión con 1500 – 1875 cm³ de **CURASEMILLAS MIRKA** en 100 litros de agua. Colocar la suspensión en un pileton o tanque, sumergir los cortes durante 5 minutos. No utilizar el baño por más de 2 días, pues se degrada por la suciedad de la papa. Al reponer el líquido gastado, hacerlo con una concentración 10% más alta que la original. Con 1000 litros se pueden tratar 400 – 500 bolsas.

RESTRICCIONES DE USO: Las semillas tratadas serán destinadas únicamente a la siembra, no siendo aptas para alimentación, forraje o extracción de aceite.

La venta de semilla tratada, para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley 18.073 que prohíbe la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados a consumo humano y/o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas) en granos para consumo, la ley establece severas penas a los infractores. Recuerde que una bolsa de semilla curada, mezclada en varios silos de granos para consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa

Período de carencia: no aplicable por su forma de uso (terápico de semillas).

Tiempo de reingreso al área tratada: no aplicable por su forma de uso (terápico de semillas).

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con otros terapicos para tratamiento de semillas, excepto aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO